



# ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

## Для взрослых лиц 18 лет и старше

### Вакцина Pfizer от COVID-19

#### Основная серия



Pfizer  
1 доза

Pfizer  
2 доза

Не менее 5 месяцев

#### Стимулирующая доза



Любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

### Вакцина Moderna от COVID-19

#### Основная серия



Moderna  
1 доза

Moderna  
2 доза

Не менее 5 месяцев

#### Стимулирующая доза



Любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

### Вакцина Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19

#### Основная серия



J&J  
1 доза

#### Стимулирующая доза

Любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

- **Pfizer и Moderna** (мРНК-вакцины от COVID-19) являются предпочтительными для всех доз по сравнению с вакциной **J&J**. Вы можете привиться вакциной J&J в [некоторых ситуациях](#).
- Если вы заражены **COVID-19**, подождите, пока не выздоровеете (если у вас были симптомы) и пока не закончится ваш период самоизоляции, прежде чем прививаться дозой вакцины от COVID-19.
- Для получения дополнительной информации см. «Какие вакцины мне нужны? - возраст 18 лет и старше» на веб-странице [Как привиться вакциной](#).

\*Дозы **Moderna** являются разными. Стимулирующая доза – это половинная доза. Основная серия – это полная доза.

График вакцинации людей с ослабленной иммунной системой представлен на [стр. 3](#).

График вакцинации людей, полностью привитых вакцинами, не утвержденными/разрешенными FDA, представлен на [стр. 4](#).



# ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

## Для детей 5-17 лет

### Вакцина Pfizer от COVID-19 – для лиц 12-17 лет

#### Основная серия



Не менее 5 месяцев

#### Стимулирующая доза



### Вакцина Pfizer от COVID-19 – для лиц 5-11 лет

#### Основная серия



#### Стимулирующая доза

Стимулирующая доза в настоящее время не рекомендована или не утверждена для этой возрастной группы

- Вакцина **Pfizer** для детей **5-11** лет имеет те же активные компоненты, что и вакцина для взрослых, но представляет собой меньшую дозу (1/3 дозы, которую получают подростки и взрослые). Подростки 12-17 лет получают ту же вакцину Pfizer, что и взрослые.
- Вакцина **Pfizer** - единственная вакцина от **COVID-19**, утвержденная для людей младше **18** лет.
- Если вы заражены **COVID-19**, подождите, пока не выздоровеете (если у вас были симптомы) и пока не закончится ваш период самоизоляции, прежде чем прививаться дозой вакцины от COVID-19.
- Для получения дополнительной информации см. «Какие вакцины мне нужны? - возраст 5-17 лет» на веб-странице [Как привиться вакциной](#).

График вакцинации людей с ослабленной иммунной системой представлен на [стр. 3](#).

График вакцинации людей, полностью привитых вакцинами, не утвержденными/разрешенными FDA, представлен на [стр. 4](#).



# ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

## Для людей с ослабленной иммунной системой

### Вакцина Pfizer от COVID-19 - для лиц 12 лет и старше

#### Основная серия



#### Стимулирующая доза

Не менее 3 месяцев

12-17 лет - только вакцина Pfizer  
18 лет и старше - любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

### Вакцина Pfizer от COVID-19 - для лиц 5-11 лет

#### Основная серия



#### Стимулирующая доза

Стимулирующая доза в настоящее время не рекомендована или не утверждена для этой возрастной группы

### Вакцина Moderna от COVID-19 - для лиц 18 лет и старше

#### Основная серия



#### Стимулирующая доза

Любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

### Вакцина Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19 - для лиц 18 лет и старше

#### Основная серия

#### Дополнительная доза

#### Стимулирующая доза



Любая вакцина от COVID-19  
(предпочтительно Pfizer или Moderna\*).

- Людям 5 лет и старше с **умеренно или значительно ослабленной иммунной системой** (например, при наличии рака крови или при прохождении определенных видов лечения раковых заболеваний, при пересадке органов и при наличии определенных аутоиммунных состояний) следует привиться дополнительной дозой в основной серии. Людям 12 лет и старше также следует привиться стимулирующей дозой. Кроме того, некоторым людям 12 лет и старше, имеющим такие заболевания/состояния, рекомендуется профилактический препарат Evusheld. Посетите веб-страницу о [медицинских препаратах](#) и проконсультируйтесь со своим врачом.
- Если вы заражены COVID-19, подождите, пока не выздоровеете (если у вас были симптомы) и пока не закончится ваш период самоизоляции, прежде чем прививаться дозой вакцины от COVID-19.
- Для получения дополнительной информации см. «Какие вакцины мне нужны? - Ослабленная иммунная система» на веб-странице [Как привиться вакциной](#).

\*Дозы Moderna являются разными. Стимулирующая доза - это половинная доза. Основная серия/дополнительные дозы - это полная доза.



# ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Стимулирующая/дополнительная доза (ы) для людей, которые были полностью вакцинированы серией вакцины за пределами США, во время клинического испытания или серией, состоящей из разных вакцин

Людам, считающиеся **полностью вакцинированными** основной серией вакцины от COVID-19, не одобренной/утвержденной FDA, следует придерживаться нижеприведенного графика для прививки стимулирующей и/или дополнительной дозой вакцины от COVID-19. См. примечания, в которых дано определение полной вакцинации.

## Лица 12 лет и старше



## Лица 12 лет и старше с ослабленной иммунной системой



- Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели после прививки:
  - Последней дозой серией вакцины, которая [внесена в список для экстренного использования](#) Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время это включает в себя вакцины AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute of India Pvt. Ltd (Covishield и Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech International (Covaxin) и Novavax (Nuvaxovid). Ознакомьтесь с текущим [списком ВОЗ разрешенных к экстренному использованию вакцин от COVID-19](#).
  - Последней дозой «смешанной» комбинации вакцин, разрешенных/утвержденных FDA и/или вакцин, внесенных в список ВОЗ (только если первые 2 дозы были сделаны с интервалом не менее 17 дней).
  - Всеми рекомендованными «активными» вакцинами от COVID-19 (не плацебо) в клиническом испытании вакцины. Примечание: вакцина должна быть либо вакциной, внесенной в список ВОЗ, которая не одобрена/утверждена FDA, либо вакциной, для которой Совет по мониторингу данных и безопасности США или его эквивалент независимо [подтвердил ее эффективность](#).
- Если вы не отвечаете критериям полной вакцинации, ознакомьтесь с информацией CDC о вакцинах за пределами США/введенных в рамках клинического испытания, в [Приложениях E и F](#).
- Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 – это единственные вакцины, утвержденные в качестве дополнительной дозы или стимулирующей дозы для людей, которые не привились основной серией вакцины от COVID-19, утвержденной/разрешенной COVID-19.
- Если вы заражены COVID-19, подождите, пока не выздоровеете (если у вас были симптомы) и пока не закончится ваш период самоизоляции, прежде чем прививаться дозой вакцины от COVID-19 или следующей дозой.
- Для получения дополнительной информации см. раздел [Когда я считаюсь привитым всеми необходимыми дозами вакцин от COVID-19?](#) на веб-странице [После вакцинации](#).

\*Стимулирующая доза вакцины Moderna – это половинная доза.